

DESCRIPTION D'UN ÉLATÉRIDE NOUVEAU DE MADAGASCAR,

PAR M. E. FLEUTIAUX.

Le genre *Diplophœnicus* a été décrit par Candèze (1) sur un seul des cinq individus récoltés à la Montagne d'Ambre, par Ch. Alluaud. Depuis, l'espèce a été capturée de nouveau, le Dr Sicard, notamment, l'a reprise en nombre dans la même région, mais toujours des mâles seulement. J'ai eu l'occasion déjà, en étudiant les collections du Muséum de comparer ce curieux insecte avec les genres qu'il avoisine et de décrire une seconde espèce (2).

Le Dr Sicard a également, et en même temps, récolté une autre forme de couleur brune, qui constitue une troisième espèce; je la décris ci-après, en lui conservant le nom *in litteris* que je lui avais donné autrefois.

1. — Assez large. Noir. Pronotum pointillé, presque lisse. Élytres non déprimés en dessus postérieurement; stries légères dans la partie antérieure... *nitidus*.  
— Étroit. Élytres déprimés en dessus postérieurement; stries bien marquées dans la partie antérieure..... 2.
2. — Noir. Pronotum trapézoïdal; fortement ponctué en avant, très finement et très légèrement en arrière. Antennes dépassant la moitié du corps... *Alluaudi*.  
— Brun. Pronotum subparallèle, fortement et densément ponctué sur toute la surface. Antennes ne dépassant pas la moitié en corps, plus grêles, les branches prolongeant les articles 4 à 11 au sommet, moins longues..... *Candèzei*.

**Diplophœnicus Candèzei** nov. sp.

♂, 12 à 13 mm. 1/4. — Allongé, brun, glabre, tête rugueuse, déprimée en avant; bord antérieur directement soudé au labre; crêtes surantennaires soulevées; yeux saillants; mandibules saillantes, falciformes. Antennes noirâtres, de 12 articles, atteignant la moitié du corps, longuement flabellées du 4<sup>e</sup> au 11<sup>e</sup> article; dernier simple, aussi long que la lamelle des précédents, pronotum à peu près aussi long que large, subparallèle, peu convexe, fortement et densément ponctué sur toute la surface; angles antérieurs droits; angles postérieurs courts, divergents. Elytres plus larges que le

(1) *Ann. Soc. Ent. Belgique*, 1895, p. 69.

(2) *Bull. Soc. Ent. France*, 1907, p. 87 — *Ann. Soc. Ent. France*, 1929, p. 223.

pronotum, atténués en arrière, peu convexes, déprimés en dessus postérieurement, fortement ponctués-striés, surtout vers le bout. Dessous de même couleur. Fémurs jaunes; tibias et tarses noirâtres.

Montagne d'Ambre, Diégo-Suarez. Muséum de Paris. — Ma collection.

Très voisin de *D. Alluaudi* Candèze; en diffère par la forme générale plus svelte; la couleur brune; les antennes moins longues, plus grêles, moins longuement flabellées; le pronotum subparallèle, ou à peine rétréci en avant, fortement ponctué sur toute la surface.

Je rapporte à cette espèce deux exemplaires au pronotum trapézoïdal, mais entièrement ponctué, provenant de la région de Tamatave, Anderovante, Beforona (D<sup>r</sup> G. Bouet). Muséum de Paris.

DEUX CONOGNATHA NOUVEAUX DE COLOMBIE (COL. BUPRESTIDÆ).

PAR M. A. THÉRY.

**Conognatha (Pithiscus) callioma** Blanch. mss. n. sp. (Fig. 1).

Long. 27 mm.; larg. 8 mm. Allongé, très étroit, tête et pronotum noirs, élytres d'un brun fauve avec une grande tache bleue occupant plus de la moitié postérieure et s'avancant anguleusement sur la suture. Dessous bleu foncé à l'exception de l'abdomen qui est noir. La tête, le pronotum et le dessous couverts d'une longue pubescence laineuse, molle et peu dense.




Fig. 1. — *Conognatha callioma* Blanch.

Tête impressionnée en avant, finement et très densément ponctuée, les côtés du front convergents vers le haut. Yeux assez saillants. Antennes très grêles. — Pronotum en trapèze, ses côtés droits et très obliques vers l'avant, ses angles postérieurs complètement arrondis, le disque couvert d'une grosse ponctuation assez régulière, impressionné le long des côtés et devant l'écusson. — Écusson cordiforme, lisse. — Élytres à côtés presque parallèles,

presqu'isolément arrondis à l'apex, denticulés latéralement sur le quart postérieur et à l'apex, avec une épine suturale assez forte et un petit sinus contre cette épine, ils sont parcourus par des stries entre lesquelles la surface est bombée et forme 9 petites côtes très égales et régulières au milieu du disque et à la base, très irrégulières, sauf les 3 premières, à l'apex. Dans ces côtes ne sont pas comptées la suturale, la marginale et la justa-scutellaire, cette dernière très courte. — Prosternum lisse et marqué de quelques gros points. — Métasternum à peine renflé au bord antérieur. — Abdomen à peine ponctué, le dernier sternite largement tronqué échancré, ♂. Tarses longs.

Hab. : Colombie, N. Grenade, C. Paruzaki, 1840.

Cette espèce ressemble à *C. olivacea* Saund. quant à la forme générale, mais en diffère par son système de coloration très particulier dans le genre et par ses côtes élytrales régulières comme chez *C. Mayeti* Théry.

**Conognatha Rochereau** n. sp. (Fig. 2.).

Long. 21<sup>mm</sup>,5; larg. 7<sup>mm</sup>,75. — Allongé, étroit, entièrement d'un bleu foncé presque noir, avec des bandes d'un jaune orangé sur les




Fig. 2. — *Conognatha Rochereau* Théry.

élytres. Tête, pronotum et dessous à l'exception de l'abdomen, couverts d'une longue pubescence grise laineuse. Dessous d'un bleu plus clair que le dessus.

Tête impressionnée en avant, finement ponctuée, front étroit, à côtés presque parallèles; yeux bombés et assez saillants; antennes grêles. — Pronotum en trapèze, ayant sa plus grande largeur près de la base, un peu rétréci tout contre les angles postérieurs, ses côtés presque droits et très obliques vers l'avant, la surface finement et régulièrement ponctuée, les angles postérieurs largement impressionnés ainsi que les côtés, l'impression remontant le long des bords sans atteindre le sommet, une large impression au devant de l'écusson. — Écusson cordiforme, lisse, bombé. — Élytres à peine plus larges aux épaules que la base du pronotum, faiblement atténués postérieurement, subconjointement arrondis à l'extrémité et denticulés latéralement sur plus du tiers de leur longueur, avec 2 dents apicales à l'extrémité de chaque élytre, entre lesquelles se trouve un petit sinus. Disque parcouru par 4 grosses côtes arrondies et très saillantes, entières à l'exception de la 3<sup>e</sup> qui est raccourcie avant l'apex, les intervalles entre ces côtes sont faiblement costiformes, il n'existe aucune trace de ponctuation. Disque orné d'une étroite fascie transversale droite touchant la marge et interrompue par la suture, située vers le quart postérieur; d'une autre fascie raccourcie de chaque côté et située au tiers antérieur, enfin d'un petit point de même couleur que les fascies et situé dans l'angle que forment les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> côtes en se réunissant à la base. — Prosternum rugueux, saillie large, arrondie au sommet; métasternum échancré au bord antérieur et légèrement renflé. — Abdomen faiblement ponctué, brillant, son dernier sternite largement tronqué-échancré (♂); tarses postérieurs très longs, presque aussi longs que les tibias.

Hab. : Colombie, État de Santander, Pampluna, 2.500 m. (P. Rochereau 1920). Cette espèce se place dans le voisinage de *C. olivacea* Saund, dont elle a à peu près la forme.

Cette espèce doit avoir certains rapports avec *C. coeruleipennis* Obb. de Colombie dont je ne connais que la description, j'y relève les différences suivantes : Chez *C. coeruleipennis* le pronotum est 2 fois  $\frac{2}{5}$  aussi large que long, chez *Rochereaui* seulement 1 fois  $\frac{7}{10}$ , chez la première espèce les angles postérieurs du pronotum sont droits, obtus chez la 2<sup>e</sup>, chez cette dernière également la surface du pronotum est assez finement et régulièrement ponctuée et non grossièrement comme chez *coeruleipennis*, ses côtes élytrales ne sont nullement tranchantes, les bords sont denticulés à partir du tiers postérieur et non du quart, l'apex offre une petite échancrure entre les deux épines apicales, enfin *coeruleipennis* ne possède qu'une seule bande claire sur les élytres, mais ce dernier caractère seul serait sans valeur car les bandes et taches disparaissent souvent chez les *Conognatha*.